



સોરાયસિસ - વિહંગાવલોકન

આ પત્રિકાના લક્ષ્યો શું છે?

બ્રિટિશ અસોસિએશન ઓફ ડર્મેટોલોજિસ્ટ્સ સોરાયસિસ વિશે ત્રણ દરદી માહિતી પત્રિકા રજૂ કરે છે. એમાંનું એક તમને વિષયનું વિહંગાવલોકન પૂરું પાડવા માટે લખવામાં આવ્યું છે. તે તમને જણાવે છે કે સોરાયસિસ શું છે, તે શેના કારણે થાય છે, તેના માટે શું કરવું જોઈએ અને ક્યાંથી તમે તેના વિશે વધુ જાણી શકશો. બે અન્ય પત્રિકાઓ ('સોરાયસિસ માટેની ટોપિકલ સારવાર' અને 'મધ્યમ અને ગંભીર સોરાયસિસની સારવાર') જુદા જુદા પ્રકારની સારવાર વિશે વધુ વિગતો આપે છે.

સોરાયસિસ શું છે?

સોરાયસિસ ત્વચાની સામાન્ય સમસ્યા છે જે વસ્તીના આશરે 2%ને અસર કરે છે. તે પુરુષો અને મહિલાઓ એમ બન્નેમાં સમાન રીતે થાય છે, કોઈપણ વયે, અને અજાણતા જ આવવા અને જવાનું વલણ ધરાવે છે. તે ચેપી નથી, અને ત્વચા પર ત્રણ પાડતું નથી.

સોરાયસિસ શેના કારણે થાય છે?

ત્વચા વિવિધ જુદા જુદા સ્તરોનું બનેલ એક જટિલ અંગ છે. ત્વચાની બહારની બાજુનું સ્તર (એપિડર્મિસ (બાહ્ય ત્વચા) જે કોષો ધરાવે છે તે તદ્દન નીચેના ભાગમાં બને છે અને ત્યારબાદ ઉપરની સપાટી તરફ ખસે છે, ધીમે ધીમે જેમ આગળ જતા તેઓ પરિવર્તિત થાય છે, છેવટે સપાટી પરથી ખરી જતા પૂર્વે મૃત્યુ પામે છે. આ મુસાફરીમાં સામાન્ય રીતે 3 થી 4 અઠવાડિયાનો સમય લાગતો હોય છે. સોરાયસિસમાં, અસરગ્રસ્ત ત્વચાની આવન-જવનના દરમાં નાટ્યાત્મક રીતે વધારો થાય છે, એટલે કે કોષો બને છે અને 3 કે 4 જેટલા ઓછા દિવસોમાં ખરી પડે છે. આ માટેનું કારણ હજી સુધી પૂર્ણ પાણે સમજાયું નથી.

અમુક લોકોને અન્યો કરતા સોરાયસિસ થવાની વધુ સંભાવના રહેશે, ખાસ કરીને, જો તેઓના પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય જેઓને સોરાયસિસ હોય: બીજા શબ્દોમાં, તે જૅનેટિક અથવા વારસાગત રોગ છે (નીચે જુઓ). જો કે,

સોરાયસિસ થવાની પ્રક્રિયા માટે ઘણીવાર બહારના કારક હોય છે, જેમ કે ગળાનો ચેપ, તણાવ અથવા ત્વચા પર ઈજા થવી.

વ્યવહારિક રીતે, મોટા ભાગના દરદીઓ જેઓને સોરાયસિસ થયો છે, અથવા જેઓને તે મટી ગયો હોય અને ત્યારબાદ ફરીથી થયો છે, તેઓમાં કોઈ દેખીતું કારણ શોધી શકાયું નથી. સામાન્ય રીતે સૂર્યપ્રકાશ સોરાયસિસમાં સુધારો કરે છે, જો કે તે ક્યારેક તેને વધુ ખરાબ બનાવી શકે (ખાસ કરીને જો ત્વચાને ઈજા પહોંચી હોય તો). વધુ પડતા દારુના સેવન અને ધૂમ્રપાનથી, તેમ જ અન્ય સ્થિતિઓ માટે વપરાતી દવાઓને કારણે પણ સોરાયસિસ વધુ ખરાબ થઈ શકે - જેમ કે લિથિયમ, મલેરિયાની સારવાર માટે વપરાતી અમુક ટીકડીઓ, અને અન્ય દવાઓ જેવી કે બીટા બ્લોકર્સ (આ દવાઓનો સામાન્ય રીતે એન્જીઈના અને ઊંચા બ્લડ પ્રેશરના ઉપચાર તરીકે ઉપયોગ થાય છે). આહાર અને સોરાયસિસ વચ્ચે કોઈ દેખીતો સંબંધ નથી.

સોરાયસિસ વારસાગત છે?

હા, પરંતુ જે રીતે તે વારસામાં ઊતરી આવે છે તે જટિલ છે અને હજુ સુધી પૂર્ણ પણે સમજાયું નથી. ઘણા જનીનો સામેલ છે, અને જો જનીનોનું યોગ્ય સંયોજન વારસામાં મળે તો પણ સોરાયસિસ ન થાય એવું બની શકે.

સોરાયસિસના વારસાની અન્ય લાક્ષણિકતાઓ આ મુજબ છે:

- જ્યારે તેઓ વૃદ્ધ હોય ત્યારે જેઓમાં તે વિકસ્યો હોય તેના કરતા જ્યારે તેઓ યુવાન હોય ત્યારે જેઓને તે થયો હોય તેવા લોકોમાં સોરાયસિસના ક્રોનિક ઈતિહાસની વધુ સંભાવના રહેશે.
- બાળકના માતાપિતા પૈકીમાંથી કોઈ એકને સોરાયસિસ હોય તો, તેમને સોરાયસિસ થવાની સરેરાશ 4 માંથી 1 શક્યતા રહેશે.
- જો જોડિયા બાળકો પૈકી એકને સોરાયસિસ હોય, જો જોડિયા બાળકો સમરૂપ હોય તો, અન્ય બાળકને તે થવાની 70% સંભાવના રહેશે, પરંતુ જો જોડિયા બાળકો સમરૂપ ન હોય તો કેવળ 20% સંભાવના રહેશે.

સોરાયસિસના લક્ષણો શું છે?

- ઘણા લોકો માટે સોરાયસિસની મુખ્ય સમસ્યા તે જેવું દેખાય છે તે, અને જે રીતે તે અન્યોને ટિપ્પણીઓ કરવા પ્રેરે છે, તે જ છે. આ તેઓની જીવનની ગુણવત્તાને અસર કરી શકે.
- સોરાયસિસમાં ખંજવાળ આવી શકે અને અસરગ્રસ્ત ત્વચા ફાટી શકે, જે પીડાકારક હોઈ શકે.
- સોરાયસિસ સાથેના અમુક લોકોને સાંધાઓમાં દુખાવો અને સાંધા જકડાઈ જઈ શકે, જે સોરાયસિસ સાથે સંલગ્ન આર્થ્રાઈટિસના કારણે થઈ શકે જેને સોરાયટિક આર્થ્રોપેથિ કહેવામાં આવે છે. જે સાંધાઓ મોટા ભાગે અસરગ્રસ્ત હોય છે તેમાં હાથ અને પગની આંગળીઓના અંતના સાંધા હોય છે.

સોરાયસિસ કેવું દેખાય છે?

સોરાયસિસના ઘાવો (ઈજા) જે ઘણીવાર પ્લાક્સ તરીકે ઓળખાય છે) ગુલાબી અથવા લાલ હોય છે, પરંતુ સિલ્વરી-વ્હાઈટ (ચાંદી જેવા સફેદ) ભીંગડાઓથી આવરિત હોય છે. તેઓ વિવિધ આકાર અને કદના હોય શકે, અને આસપાસની ત્વચા સાથે સારી રીતે સ્પષ્ટીકૃત થયેલ સીમા હોય છે. કેટલાક, જ્યારે ત્વચાને ઈજા થાય છે, દાખલા તરીકે ચીરો પડવાથી અથવા ખંજવાળવાથી, ત્યારે પ્રગટ થાય છે: આ ક્યોબનર ફિનોમિનન (ઘટના) તરીકે જાણીતું છે. સ્કેલ્પ (માથાની ચામડી) ઉપર, મોટી સંખ્યામાં ભીંગડા થાય છે એટલે નીચેના સ્તરની લાલાશ જોવામાં મુશ્કેલી થાય છે. તેનાથી વિપરીત, શરીરના ગડી વાળા ભાગો જેવા કે બગલ અને જંઘામૂળ (પેટ અને જંઘની વચ્ચેનો ભાગ)માં, લાલ સ્પષ્ટ રીતે દેખાતો વિસ્તાર સરળતાથી જોઈ શકાય છે પરંતુ ભીંગડા ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.

સોરાયસિસની ગંભીરતામાં સમયની સાથે, અને વ્યક્તિ થી વ્યક્તિમાં વિવિધતા હોય છે. જ્યારે તે હળવા હોય ત્યારે, તેમાં કેવળ એક અથવા બે પ્લાક હોઈ શકે: જ્યારે તે વધુ ગંભીર હોય ત્યારે તેમાં ઘણી સંખ્યામાં હોઈ શકે.

પ્લાક ત્વચા પર વિવિધ પેટર્ન બનાવી શકે:

- સહુથી સામાન્ય પેટર્ન ક્રોનિક સ્ટેબલ પ્લાક સોરાયસિસ છે. સ્થાયી પ્લાક મોટા ભાગે ઘૂંટણ, કોણી, ધડ અને સ્કેલ્પ પર સિમેટ્રિકલિ (સમપ્રમાણરીતે) દેખાવાનું વલણ ધરાવે છે, જો કે કોઈપણ વિસ્તારનો સમાવેશ થઈ શકે.
- ગુટ્ટાટ સોરાયસિસ એક અન્ય સ્વરૂપ છે. તે મોટા ભાગે બાળકોમાં જોવા મળે છે અને અમુકવાર ગળું આળું થવાથી પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. ગુટ્ટાટ સોરાયસિસના જખમો સામાન્ય રીતે નાના હોય છે (અવારનવાર 1 સેમી કરતા ઓછા હોય છે), પરંતુ સંખ્યાબંધ હોય છે.
- અસ્થિર સોરાયસિસમાં, સોરાયસિસના પ્લાક તેઓની સ્પષ્ટ-દેખાતી ધાર ગુમાવે, વિસ્તૃત કરે, અને અમુકવાર જોડાઈ શકે છે. નવી પ્લાક્સ પણ દેખાઈ શકે. ક્યારેક સમગ્ર ત્વચા લાલ બને છે - આ અવસ્થા ઈરિથ્રોડર્મિક સોરાયસિસ તરીકે જાણીતી છે. અસ્થિર સોરાયસિસની સારવાર સૌમ્ય બનાવટોથી કરવી જોઈએ કારણ કે વધુ પ્રબળ બનાવટો તેને વધુ ખરાબ બનાવી શકે.
- પુશ્ચ્યુલર (ફોલ્લી) સોરાયસિસના બે મુખ્ય પ્રકારો છે. પ્રથમ, અને મોટા ભાગે જેમાં, કેવળ હથેળીઓ અને તળીયાઓનો (પામો-પ્લાન્ટર પુશ્ચ્યુલોસિસ) સમાવેશ હોય છે, જે લાલ વિસ્તાર નવી પીળી ફોલ્લીઓ (પરુ વાળી) અને જૂની બ્રાઉન (તપખીરીયા રંગની) સૂકાયેલી ફોલ્લીઓનું મિશ્રણ ધરાવે છે. આ પ્રકાર ધીમે ધીમે મટે છે અને સારવારને અનેક વાર નબળો પ્રતિભાવ આપે છે. પુશ્ચ્યુલર સોરાયસિસનો એક ભિન્ન, બિનસંબંધિત, અને વ્યાપક (સામાન્યીકૃત) પ્રકાર ત્વચાના કોઈપણ ભાગને અસર કરી શકે, અને તે વધુ ગંભીર હોય છે.

જો કાળજીપૂર્વક જોવામાં આવે તો, નખમાં પણ અનેક વાર પરિવર્તનો જોવા મળી શકે. સોરાયસિસ સાથેના અડધા લોકોમાં તેઓ દેખાય છે. સહુથી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાતા આ છે:

- નખની સપાટી પર અનિયમિત ખાડા પડવા (ખાંચા પડવા).
- નખની નીચેના ગોળાકાર વિસ્તારોમાં રંગ ઉડી જવો.
- નખના મૂળમાંથી નખનું અલગ થવું.
- નખ જાડા થવા.

સોરાયસિસનું નિદાન કેવી રીતે થઈ શકે?

- સોરાયસિસને સામાન્ય રીતે સરળતાથી ઓળખી શકાય છે અને ભાગ્યે જ બાયોપ્સિની આવશ્યકતા રહે છે.
- જો ગળું આળું થવાની પ્રક્રિયાથી સોરાયસિસનો હુમલો થાય તો, તમારા ડોક્ટર તમારા ગળામાંથી સ્વોબ લેશે તે જોવા માટે કે બીટા-હિમોલાયટિક સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ તરીકે જાણીતા બેક્ટેરિઆ હાજર છે કે કેમ. જો તેઓ હાજર હોય તો, એન્ટિબાયોટિકનો કોર્સ મદદરૂપ થઈ શકે.
- જો તમે સાંધાઓના દુખાવાથી પીડાતા હો તો, તમારા ડોક્ટર ડિમોઈઈડ આર્થ્રાઈટિસ (સંધિવા)ની તપાસ કરવા માટે રક્ત પરીક્ષણ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી શકે. જો તમને વિવિધ જગ્યાએ સોજાઓ હોય અથવા દુખતા સાંધા હોય તો, તમારે ડિમોઈલોજિસ્ટ, એટલે કે સાંધાના રોગોના નિષ્ણાંત, દ્વારા આકારણી કરાવવાની આવશ્યકતા રહેશે.

શું સોરાયસિસ મટાડી શકાય?

ના. જો કે, ચિહ્નો અને લક્ષણોનું નિયંત્રણ કરવાની સારવાર સામાન્ય રીતે અસરકારક હોય છે. ત્વચા પર ઓછા પ્રમાણમાં ભીંગડા થાય છે અને ત્યારબાદ તે સંપૂર્ણ સામાન્ય દેખાઈ શકે. તેમ છતાં, જો તમારો સોરાયસિસ સારવાર પછી ગાયબ થાય તો પણ, તે તે પાછો થવાનું વલણ ધરાવે છે. આવું ઘણા વર્ષો સુધી પણ ન થાય, અને થોડાક અઠવાડિયાની અંદર પણ થઈ શકે.

સોરાયસિસનો ઉપચાર કેવી રીતે થશે?

આ તમને હોય તે સોરાયસિસના પ્રકાર, અને તેની ગંભીરતા પર ઉપર આધારિત હશે.

1. ટોપિકલ ઉપચારો.

એ સારવારો જે સીધી જ ત્વચા પર લગાડવામાં આવે છે તે ટોપિકલ ઉપચારો તરીકે જાણીતી છે. તેઓમાં ક્રીમો, ઓઈન્ટમેન્ટ્સ, પેસ્ટ અને લોશનનો સમાવેશ છે. જો તમારો સોરાયસિસ હળવો હોય તો, ટોપિકલ ઉપચારો તમારી સારવારનો મુખ્ય આધાર બનશે. ટોપિકલ સારવારો અમારી અન્ય પત્રિકા ("*સોરાયસિસ માટેની ટોપિકલ સારવારો*")માં વધુ વિગતવાર આપવામાં આવેલ છે, અને તેમાં નિમ્નલિખિતનો સમાવેશ છે:

- ઈમોલિઅન્ટ્સ. ઈમોલિઅન્ટ્સ (શામકો) ભીંગડામાં ઘટાડો કરે છે અને તેમનો આવશ્યકતા મુજબ વારંવાર ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
- સેલિસિલિક એસિડ. સેલિસિલિક એસિડ ધરાવતી બનાવટો વિપુલ પ્રમાણમાં થયેલા ભીંગડા પેદા કરતા પ્લાકમાં મદદરૂપ થઈ શકે.
- ટોપિકલ સ્ટિરોઈડ્સ. નિર્બળ સ્ટિરોઈડ્સ સોરાયસિસના જાડા ઘા (ઈજા) પર ઘણી વાર સારી રીતે કાર્ય કરતી નથી, પરંતુ ત્વચાની ગડીઓમાં અથવા ચહેરા પર સારી રીતે કાર્ય કરી શકે. વધુ પ્રબળ સ્ટિરોઈડ્સથી સંભવિત આડ-અસરો થઈ શકે, તેમાંની એક તમારી ત્વચાને કૃશ બનાવે છે. તમારા ડોક્ટર તેઓના વપરાશની નજીકથી દેખરેખ રાખશે. જ્યારે ટોપિકલ સ્ટિરોઈડ સારવાર બંધ કરવામાં આવે ત્યારે, સોરાયસિસનું અમુકવાર ઝડપથી પ્રત્યાગમન થાય છે.
- ટાર બનાવટો. દવાયુક્ત ટાર સ્નાન લેવાથી મુક્ત ભીંગડાઓ દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે. ટાર ક્રીમ અથવા ઓઈન્ટ્મન્ટ્સ મોટા ભાગના દરદીઓમાં મદદરૂપ થઈ શકે પરંતુ તે ગંદું હોઈ શકે અને કપડા પર ડાઘા પાડી શકે.
- ડાઈથ્રાનોલ. ડાઈથ્રાનોલ મધ્યમ સોરાયસિસ માટે ખાસ કરીને જો પાણીથી સાફ થઈ શકે એવાં ક્રીમ સૂચિત કરવામાં આવે તો, આનો ઘરે ઉપયોગ થઈ શકે. ડાઈથ્રાનોલનો ઘણીવાર અલ્પ-સંપર્ક ઉપચાર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે કેવળ સોરાયસિસ વાળા વિસ્તારમાં જ લગાડવી અને તેમની વચ્ચે રહેલ સામાન્ય ત્વચા પર નહીં, અને 30 થી 60 મિનિટ પછી ધોઈ કાઢવી. ડાઈથ્રાનોલની માત્રામાં ધીમે ધીમે દર 3-5 દિવસે વધારો કરવો. જો ઉપચાર કરેલ વિસ્તારો પર સોજો આવે તો, આ સ્થિર થાય ત્યાં સુધી સારવાર બંધ કરવાની રહેશે, પરંતુ ત્યારબાદ ઓછી સાંદ્રતાથી ફરી શરૂ કરી શકો. તમારો સોરાયસિસ સારો થવાના કારણે, ઉપચાર કરેલ વિસ્તારો પર ધીમે ધીમે બ્રાઉન રંગના ડાઘા થઈ જશે. આગામી બે અઠવાડિયા સુધીમાં ડાઘા જતા રહેશે. ઘણા દરદીઓને આ સારવારથી તેઓનો સોરાયસિસ 6 અઠવાડિયામાં સારો થઈ શકે. અમુક દરદીઓ અલ્પ સંપર્ક ઉપચારને પ્રતિભાવ આપતા નથી અથવા તેઓનો સોરાયસિસ ઘરે સારવાર કરવા માટે અતિશય વ્યાપક હોઈ શકે. તેઓનો ત્યારબાદ ડર્મેટોલોજિસ્ટના આઉટપેશન્ટ યુનિટમાં ઉપચાર કરવો જોઈએ અથવા ડર્મેટોલોજિસ્ટ વોર્ડમાં 2-3 અઠવાડિયા દાખલ કરવા જોઈએ. બહારના દરદીઓએ પ્રત્યેક દિવસે 1 થી 2 ક્લાક માટે ક્લિનિક પર આવવાની આવશ્યકતા રહેશે, અને ટાર બાથ અને/અથવા અલ્ટ્રાવાયલટ લાઈટ, ઉપરાંત ઘરે જે અલ્પ સંપર્ક સારવારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના કરતા ડાઈથ્રાનોલની જાડી પેસ્ટ લગાડવામાં આવે છે. અવારનવાર ડાઈથ્રાનોલથી ત્વચા પર બળતરા થઈ શકે, તેને સોજાયુક્ત બનાવી શકે અને તે અને ઉપચાર કરેલ વિસ્તારોની આજુબાજુનો ભાગ આળો થઈ શકે. ડોક્ટરની સલાહ વિના તેના વડે ચહેરાનો ઉપચાર કરવો જોઈએ નહીં, કારણ કે તેનો આંખ સાથે સંપર્ક ટાળવો જોઈએ અને તેનાથી ગંદું થવાથી આજુબાજુ પેદા થઈ શકે. ડાઈથ્રાનોલ કેવળ ત્વચા અને કપડા પર ડાઘા પાડતું નથી, પરંતુ તેની સાથે સાથે સ્નાનાગાર અને શાવરમાં પણ પાડે છે. કાયમી ડાઘાને ટાળવા માટે સ્નાનાગાર અને શોવરને તાત્કાલિક સ્વચ્છ કરવા જોઈએ.
- વિટામિન ડી એનેલોગ્સ. વિવિધ વિટામિન ડી બનાવટોનો સોરાયસિસની સારવાર માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે: કેલ્સિપોટ્રીઅલ, કેલ્સિટ્રીઅલ અને ટેકાલ્સિટોલ. તેઓ સલામત છે, ઉપયોગ કરવા માટે સ્વચ્છ છે અને ત્વચા પર ડાઘા પાડતી નથી. સારવારને ક્યાં તો એક વખત (ટેકાલ્સિટોલ) અથવા તો બે વખત

(કેલ્સિપોટ્રીઅલ અને કેલ્સિટ્રીઅલ) દરરોજ લગાડવાની છે અને આવશ્યકતા મુજબ લાંબા સમય સુધી લઈ શકાય. (તેનાથી) ખાસ કરીને, ચહેરા, નિતંબ અને જનનાંગ પર, બળતરા થઈ શકે, અને કેવળ તમારા ડોક્ટરની ખાસ સૂચના હોય તો જ, આ સારવારો તે વિસ્તારોમાં લગાડવી જોઈએ.

- વિટામિન એ એનેલોગ્સ. ટેઝરોટેન વિટામિન એ યુક્ત જેલ છે જે દરરોજ એક વખત સોરાયસિસના ઘા પર લગાડવાની હોય છે. જો તેને ચહેરા અથવા ત્વચાની ગડીઓ પર લગાડવામાં આવે તો, બળતરા થઈ શકે. **જો તમે સગર્ભા હો અથવા સ્તનપાન કરાવતા હો તો, તમારા ડોક્ટરને તે જણાવવાનું અગત્યનું છે, અને તમારે તમારી સારવાર દરમિયાન સગર્ભા થવાનું ટાળવું જોઈએ.**

ખાસ સ્થળો માટેની ટોપિકલ સારવારો

- ત્વચાની ગડીઓ અને ચહેરો. ઓછી શક્તિવાળું સ્ટિરોઈડ ક્રીમ અથવા ઓઈન્ટમન્ટ, અથવા ટાર બનાવટોને દિવસમાં એક વખત અથવા બે વખત ઉપયોગ કરવા માટે પ્રિસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવી શકાય. તમારા ડોક્ટર દ્વારા નિયમિત સમીક્ષાથી ખાતરી રહેશે કે ઉપયોગ કરાતી માત્રા સલામત મર્યાદાની અંદર છે.
- સ્કેલ્પ. સ્ટિરોઈડ અથવા કેલ્સિપોટ્રીઅલ સ્કેલ્પ લોશન ઉપરાંત દવાયુક્ત ટાર અથવા નાળિયેર તેલ યુક્ત શેમ્પુનો ઉપયોગ કરી શકાય. ટાર અથવા નાળિયેર તેલની બનાવટોને રાત્રે સમગ્ર સ્કેલ્પમાં ઘસવી જોઈએ અને પછીની સવારે ટાર શેમ્પુ વડે ધોઈ નાખવું. આખી રાત શાવર કેપ પહેરવાથી સારવારને અંદર પેસવામાં મદદ મળે છે અને તે તમારા ઓશિકાની ખોળને ડાઘા પડવાથી સુરક્ષા આપે છે.
- નખ. તેના માટે કોઈ વિશ્વસનીય અસરકારક સારવાર નથી. તેમને થેપ લાગતો અટકાવવા માટે નખને કાપેલા રાખવા જોઈએ.

૨. ફોટોથેરપી (અલગ માહિતી પત્રિકા જુઓ)

આ ટર્મ અલ્ટ્રાવાયલટ લાઈટના વિવિધ રુપો સાથેની સારવારનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેને ક્યારેક વિશિષ્ટ ટેબ્લેટ્સ લેવાથી સહાયતા મળે છે. જો સોરાયસિસ વ્યાપક હોય, અથવા, ટોપિકલ સારવારથી દૂર થવામાં નિષ્ફળતા મળી હોય, અથવા દૂર થયા પછી ઝડપથી પાછો થાય તો, તે મદદરૂપ થાય છે. ટોપિકલ ઉપચાર સામાન્ય રીતે ફોટોથેરપી દરમિયાન ચાલુ રહેશે.

ખાસ મશીનોનો ઉપયોગ કરીને, બે પ્રકારની અલ્ટ્રાવાયલટ (યુવી) લાઈટ આપી શકાય: યુવીએ અને યુવીબી. આ સામાન્ય સૂર્યપ્રકાશના ભિન્ન હિસ્સાઓ છે. યુવીએ સાથેની સારવારમાં *સોરાલેન* તરીકે જાણીતો ઔષધોપચાર લેવાથી મદદ મળે છે -આ સંયોજન પીયુવીએ થેરપી તરીકે જાણીતું છે. યુવીબી સાથેની સારવારમાં ટીકડીઓ લેવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

યુવીબી અને પીયુવીએ એમ બન્ને સારવારો ખૂબ જ કાળજી સાથે આપવામાં આવે છે, અને તમારે ઘણા બધા અઠવાડિયા માટે અઠવાડિયામાં ૨ અથવા ૩ વખત ત્વચા વિભાગમાં આવવાનું રહેશે. સંપૂર્ણ વિગતો ધ બ્રિટિશ

અસોસિએશન ઓફ ડર્મેટોલોજિસ્ટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ અન્ય પત્રિકા ("મધ્યમ અને ગંભીર સોરાયસિસ માટેની સારવારો" અને "ફોટોથેરાપી") માં આપવામાં આવેલ છે.

૩. આંતરિક સારવારો

સોરાયસિસની સારવાર માટે ટીકડીનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર આકર્ષક છે, પરંતુ અસરકારક વસ્તુઓ હોય તે તમામના સંભવિત જોખમો હોય છે, તેથી જો તેને સરળ રીતે નિયંત્રણ હેઠળ રાખી શકાય તો, તેઓનો સોરાયસિસ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. ઉપરાંત, તમે ટીકડીઓ લઈ રહ્યા હો છતાં પણ, તમારે સામાન્ય રીતે કેટલાક ટોપિકલ ઉપચારો સાથે ચાલુ રાખવાના આવશે.

જો તમને આ પ્રકારની સારવાર શરૂ કરવામાં આવશે તો, તમારા ડર્મેટોલોજિસ્ટ તમારી સાથે જોખમોની ચર્ચા કરશે. તમામ ટીકડીઓમાં રક્ત પરીક્ષણોની આવશ્યકતા રહેશે, અને તે અન્ય દવાઓ સાથે ઘણી દખલ કરી શકે. સોરાયસિસ માટેની કોઈપણ ટીકડીઓ લેવા દરમિયાન મહિલા દરદીઓએ સગર્ભા થવું જોઈએ નહીં, અને તેમાંની કેટલીક લેતા પુરુષ દરદીઓ માટે તે અગત્યનું છે કે તેઓએ પિતા બનવું જોઈએ નહીં.

જેની વાત થાય છે તે ટીકડીઓમાં એસિટ્રેટિન (વિટામિન એ સાથે સંબંધિત), સાઈક્લોસ્પોરિન (ઈમ્યૂન સિસ્ટમને સપ્રેસ (દાબી દેવું) કરે છે), મેથોટ્રેક્સેટ (જેથી ત્વચાના કોષોનું સોરાયસિસમાં વિભાજન થાય છે તે દર ધીમો કરે છે), અને હાયડ્રોક્સિકાર્બામાઈડ (અગાઉ હાયડ્રોક્સિયુરિઆ તરીકે જાણીતું હતું)નો સમાવેશ છે - તે પણ ત્વચાના કોષોનું વિભાજન થાય છે તે દર ધીમો કરે છે). અતિશય ગંભીર સોરાયસિસના પ્રકાર માટે અહીં સારવારના વિવિધ ઈન્જેક્ટેબલ સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ છે (એડાલિમુમેબ, ઈટાનરસેપ્ટ અને ઈન્ફલિક્સિમેબ). આ સારવારની સંપૂર્ણ વિગતો "મધ્યમ અને ગંભીર સોરાયસિસ માટેની સારવારો"માંથી મળી શકશે. આ સારવારો વિશે ખાસ માહિતી પત્રિકાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે.

હું શું કરી શકું?

- તમારી આસપાસ જેઓ રહે છે તેઓને સોરાયસિસ વિશે કેળવણી આપવાથી મદદ મળે છે. એક સરળ સમજૂતિ તેમની ગેરસમજોને સહાયમાં ફેરવી શકે છે. ખાતરી કરો કે તેઓ જાણે, કે સોરાયસિસ ચેપી નથી.
- જો સંભવિત હોય તો, તમારા ધૂમ્રપાન અને દારુના સેવનમાં કાપ મૂકવો.
- આધાર સમૂહ મારફત જેઓને સોરાયસિસ છે તેવા અન્યોનો સંપર્ક કરવાનો વિચાર કરો.
- તાણાવનું વ્યવસ્થાપન મદદરૂપ થઈ શકે.
- હંમેશા તમારા માટે પ્રિસ્ક્રાઈબ કરેલ હોય તે જ સારવારોનો ઉપયોગ કરવો.

સોરાયસિસ વિશે હું ક્યાંથી વધુ માહિતી મેળવી શકીશ?

દરદીને ટેકો આપતા જૂથોની લિંક્સ:

ધ સોરાયસિસ અસોસિએશન

The Psoriasis Association, Dick Coles House, 2 Queensbridge, Northampton, NN4 7BF

ટેલિફોન: 0845 676 0076 વેબ: www.psoriasis-association.org.uk

સોરાયટિક આર્થ્રોપથી અલાયન્સ

Psoriatic Arthropathy Alliance, PO Box 111, St Albans, Herts, AL2 3JQ

ટેલિફોન: 01923 672 837 વેબ: www.paalliance.org

સોરાયસિસ સ્કોટલેન્ડ આર્થ્રાઈટિસ લિંક વોલન્ટિઅર્સ

Psoriasis Scotland Arthritis Link Volunteers, 54 Bellevue Road, Edinburgh, EH7 4DE

ટેલિફોન: 0131 556 4117 વેબ: www.psoriasisScotland.org.uk

આ પત્રિકાનું લક્ષ્ય વિષય વિશે ચોક્કસ માહિતી પૂરું પાડવાનું છે અને તે બ્રિટિશ અસોસિએશન ઓફ ડર્મેટોલોજિસ્ટ્સના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ અભિપ્રાયોની સર્વસંમતિ છે: તેની વિગતો, જો કે, અવારનવાર તમને તમારા ડૉક્ટર દ્વારા આપવામાં આવતી સલાહથી જુદી હોઈ શકે.

બ્રિટિશ અસોસિએશન ઓફ ડર્મેટોલોજિસ્ટ્સ

દરદી માહિતી પત્રિકા

ઉત્પન્ન કરેલ માર્ચ 2005

અદ્યતન કરેલ માર્ચ 2009