



## میتھائریکسیٹ

### اس کتابچہ کے مقاصد کیا ہیں؟

یہ کتابچہ میتھائریکسیٹ کے بارے میں سمجھنے میں آپ کی مدد کے لئے تحریر کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، جلد کی کیفیات کے علاج کے لیے اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس بارے میں مزید معلومات آپ کو کہاں سے حاصل ہوسکتی ہے۔

### میتھائریکسیٹ کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے؟

میتھائریکسیٹ ایک دوا ہے جو اس طرح کام کرتا ہے کہ جسم کے نظام مامونیت کے لحاظ سے نئے خلیوں کی افزائش کو سست کر دیتا ہے۔ یہ پہلی بار، اعلیٰ خوراک میں، کینسر کا علاج کرنے کے لئے استعمال ہوا تھا، لیکن کینسر کا علاج کرنے کے لئے استعمال کردہ خوراک کے لحاظ سے قدرے کم خوراک پر جلد اور جوڑوں کے امراض کے لئے ایک مؤثر علاج ثابت ہوا تھا۔ میتھائریکسیٹ سوزش کو کم کرسکتا اور اس طریقے سے مزمن امراض کا علاج کرنے میں معاون ہوسکتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا کام نظام مامونیت (جسم کا خود اپنا دفاعی نظام) کی سرگرمی کو کم کرنا ہے، لہذا اسے ہمیشہ احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔

### جلد کی کن کیفیات کا علاج میتھائریکسیٹ سے کیا جاتا ہے؟

میتھائریکسیٹ کا استعمال چنبل، چنبل نما وجع المفاصل، اور جلد کی دشواریوں کی دیگر بہت ساری اقسام بشمول چھالہ، پھپھولا، لحمی سوزش، تصلب جلد، جلد اور پٹھوں کی سوزش اور ایگزیمہ کے علاج کے لئے ہوتا ہے۔

### مجھے کتنے لمبے عرصے تک میتھائریکسیٹ لینے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا؟

میتھائریکسیٹ فوری طور پر کام نہیں کرتا ہے۔ آپ کو کوئی فائدہ نظر آنے سے پہلے اس میں 3-12 ہفتے لگ سکتے ہیں۔

### مجھے میتھائریکسیٹ کب لینا چاہیے؟

میتھائریکسیٹ بالعموم ٹیبلٹ کی شکل میں ہفتہ میں ایک بار، ہر ہفتے اسی دن لیا جاتا ہے۔ اسے ہرگز بھی روزانہ نہیں لینا چاہیے۔ ٹیبلٹس کو غذا کے ساتھ لیا جاتا ہے اور انہیں سالم نگلنا چاہیے اور توڑنا یا چباننا نہیں چاہیے۔ میتھائریکسیٹ ہفتے میں ایک بار بذریعہ انجکشن - یا تو زیر جلد (جلد کے نیچے ایک

انجکشن، ذیابیطس کے لئے انسولین کے انجکشنوں کی طرح) یا درون عضلہ (چوڑے یا جانگہ میں) دیا جاسکتا ہے۔

2.5 ملی گرام ٹیبلٹس استعمال کے لئے سب سے زیادہ تجویز کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے خوراک میں لچک پذیری ملتی ہے۔ انہیں 10 ملی گرام کے ٹیبلٹس کے ساتھ خلط نہیں کرنا چاہیے، جو اس کے مشابہ نظر آتا ہے۔ درست مقدار تجویز کیے جانے اور دیئے جانے کو یقینی بنانے کے لئے احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ کو میتھائریکسیٹ لینے سے قبل **ہمیشہ** خوراک اور مقدار کی جانچ کر لینی چاہیے۔

اگر آپ اپنے معمول کے دن میتھائریکسیٹ لینا بھول جاتے ہیں تو، آپ اسے اگلے دن یا دوسرے دن لے سکتے ہیں: تاہم، اگر آپ کو تین دن سے زیادہ تاخیر ہوگئی ہے تو، اس ہفتے اس سے پرہیز کریں۔ دونوں صورتوں میں، اپنی اگلی خوراک اگلے ہفتے معمول کے دن لیں۔

### مجھے کون سی خوراک لینی چاہیے؟

آپ کا ڈاکٹر خوراک کے سلسلے میں آپ کو مشورہ دے گا، اور آپ کو ایک آزمائشی خوراک (بالعموم 2.5 تا 5 ملی گرام) آپ کا مستقل معالجہ شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے دیا جانا چاہیے۔ شدید قسم کے چنبل کے لئے، معمول کی خوراک 10-25 ملی گرام (کبھی کبھی 30 ملی گرام تک) کھانے کے لحاظ سے، ہفتے میں ایک بار ہے۔ معالجہ کے تئیں آپ کے ردعمل اور ضمنی اثرات کے لحاظ سے اس کو موافق بنانا چاہیے۔ کچھ مریضوں کو میتھائریکسیٹ بذریعہ انجکشن دیا جاتا ہے۔

### میتھائریکسیٹ کے ممکنہ ضمنی اثرات کیا ہیں؟

کچھ مریضوں میں میتھائریکسیٹ متلی، اسہال یا منہ کے السر کا باعث ہوسکتا ہے۔ چنبل کے علاج کے لئے مستعمل میتھائریکسیٹ کی ادنیٰ خوراک کے ساتھ بالوں کا گرنا اور سرخ باد ہونا شاذ و نادر ہیں۔ میتھائریکسیٹ لینے کا اثر شمار الدم پر پڑسکتا ہے (ایک اثر یہ ہے کہ دموی خلیے قدرے کم بنتے ہیں) اور اس طرح آپ میں انفیکشن پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوسکتا ہے۔

آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر:

- آپ کو گلے کی خراش یا کوئی اور انفیکشن ہوتا ہے
- آپ کو تپ کابی ہے
- آپ کو بلا وجہ خراش یا جریان خون ہوتا ہے
- میتھائریکسیٹ شروع کرنے کے بعد آپ میں کوئی نئی علامات فروغ پاتی ہیں

فولک ایسڈ بیشتر اوقات وٹامن کے تکملہ کے بطور تجویز کیا جاتا ہے جو ضمنی اثرات کے وقوعہ کو کم کرسکتا ہے۔ طرز عمل مختلف ہوتا ہے، اور اپنے ڈاکٹر کی تجویز پر عمل کرنا ضروری ہے۔

اگر آپ کو چھوٹی چیچک نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے فرد کے رابطے میں آئے ہیں جس کو چھوٹی چیچک یا نملہ منطقی ہے، یا جس وقت آپ میتھائریکسیٹ لے رہے ہیں اس دوران اگر آپ کو چھوٹی چیچک یا نملہ منطقی ہوجاتا ہے تو، آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ آپ کو خصوصی معالجہ درکار ہوسکتا ہے۔

اگر میتھائریکسیٹ لمبے عرصہ تک لیا جائے تو کیا اس کے کوئی اور ضمنی اثرات ہیں؟

شاذ و نادر طور پر میتھائریکسیٹ پھیپھڑے کی سوزش نیز سانس کی تنگی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ بے دم ہوجاتے ہیں تو، آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔

طویل مدتی میتھائریکسیٹ صلابت جگر کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر اگر دیگر عوامل پائے جاتے ہوں جیسے الکحل نوشی۔

**میتھائریکسیٹ معالجہ کے ضمنی اثرات کے پیش نظر مجھ پر کس طرح نگاہ رکھی جائے گی؟**

چونکہ میتھائریکسیٹ کا اثر شمار الدم پر پڑسکتا ہے، اور کبھی بھی یہ جگر کی دشواریوں کا باعث ہوتا ہے، لہذا آپ کا ڈاکٹر آپ کے اسے لیتے رہنے کے دوران آپ کے لئے خون کی مستقل جانچیں کروانے کا انتظام کرے گا۔ آپ کو میتھائریکسیٹ **برگز نہیں** لینا چاہیے سوائے اس صورت کے جب آپ خون کی یہ مستقل جانچیں نہ کروا لیں۔ خوراکیں تبدیل کیے جانے پر یہ ہفتہ وار کی جاتی ہیں اور خوراک جوں کی توں رہنے پر کم از کم ہر 2-3 مہینے پر کی جاتی ہیں۔

انفیکشن کی نشانیاں جیسے گلے کی خراش، منہ میں السر ہونا، اسہال اور دھوپ کے تئیں حساسیت بہت زیادہ میتھائریکسیٹ کی نشانی ہوسکتی ہیں۔ ان علامات کی فوراً اطلاع دینی چاہیے اور ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔

خون کی ان جانچوں میں جگر پر میتھائریکسیٹ کے اثرات کی جانچ کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی (کم کثرت سے) ان اثرات پر نگاہ رکھنے کے لئے جگر کی بایوپسیز (حیوی تشخیصات) درکار ہوتی ہیں۔

#### **BAD بایولوجیکل انٹرویشن رجسٹر [BAD] حیاتیاتی مداخلتی رجسٹر (BADBIR)**

اگر آپ کے چنبل کے علاج کے لئے آپ کو میتھائریکسیٹ کی تجویز کی گئی ہے تو، آپ سے ایک نیشنل بایولوجیکس رجسٹر (حیاتیات سے متعلق قومی رجسٹر) میں حصہ لینے کو کہا جاسکتا ہے۔ یہ رجسٹر چنبل کے مختلف معالجوں کے تحفظ کا موازنہ کرنے اور یہ دیکھنے کے لئے ہے کہ وہ کتنی اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ اس کی تشکیل حیاتیاتی معالجوں کے نام سے موسوم چنبل کے کچھ نئے معالجوں پر نگاہ رکھنے کے لئے ہوئی تھی۔ رجسٹر سے ڈاکٹروں کو اس بابت معلومات حاصل ہوگی کہ معتدل سے لے کر شدید نوعیت کے چنبل کے لئے دستیاب معالجوں کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے۔ آپ کی باخبر منظوری کے بغیر رجسٹر میں درج کوئی بھی معلومات نہیں دی جائے گی۔

**کیا میں میتھائریکسیٹ جاری رکھتے ہوئے ٹیکے لگوا سکتا ہوں؟**

یہ تجویز کی جاتی ہے کہ آپ کو 'فعال' ٹیکے جیسے پولیو، خسرہ (جرمن خسرہ) اور زرد بخار کا استعمال کر کے ٹیکے نہیں لگوانا چاہیے۔ 'غیر فعال' پولیو ویکسین 'فعال' ویکسین کے بدلے دیا جاسکتا ہے اور 'غیر فعال' ورژن ان لوگوں کو جن سے آپ کا قریبی رابطہ رہتا ہے، جیسے آپ کے گھرانے کے افراد کو دیا جانا چاہیے۔

اگر آپ میتھائریکسیٹ لے رہے ہیں تو جن بچوں کو 'فعال' پولیو ویکسین دیا گیا ہے انہیں ٹیکے لگائے جانے کے بعد 4-6 ہفتے تک آپ کو ان کے رابطے میں آنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ سالانہ 'فلو' کے

ٹیکے اور نیوموویکس محفوظ ہیں اور ان کی سفارش کی جاتی ہے۔ (Immunisations) پر PIL دیکھیں)۔

### کیا میتھائریکسیٹ کا اثر باروری یا حمل پر پڑتا ہے؟

میتھائریکسیٹ سے باروری کم ہوسکتی ہے اور اس سے نامولود بچے کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، لہذا حمل کے دوران اس کا استعمال **پرگز نہیں** ہونا چاہیے۔ میتھائریکسیٹ لیتے رہنے کے دوران اور میتھائریکسیٹ بند کردینے کے بعد کم از 3 ماہ تک، اور ترجیحی طور پر 6 ماہ تک، خواتین اور مرد دونوں کو امتناع حمل کی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہئیں۔

اگر آپ خاندان کا منصوبہ بنا رہی ہیں، یا اگر آپ میتھائریکسیٹ لیتے رہنے کے دوران حاملہ ہوجاتی ہیں تو، آپ کو جتنی جلدی ہوسکے اپنے ڈاکٹر سے اس پر گفتگو کرلینی چاہیے۔ اگر آپ میتھائریکسیٹ لے رہی ہیں تو آپ کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔

### کیا میں میتھائریکسیٹ لینے کے دوران الکحل نوشی کرسکتا ہوں؟

الکحل کا تعامل میتھائریکسیٹ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ میتھائریکسیٹ اور الکحل دونوں جگر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا دانشمندی یہ ہے کہ الکحل کا استعمال بالکل کم رکھا جائے۔

### کیا میں میتھائریکسیٹ کے ساتھ دوسری دوائیں لے سکتا ہوں؟

کچھ ادویات میتھائریکسیٹ کے ساتھ متعامل ہوتی ہیں، لہذا آپ کو ہمیشہ اپنا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو بنا دینا چاہیے کہ آپ میتھائریکسیٹ لے رہیں۔ غیر صفراوی ترشہ والی دافع سوزش ادویات جیسے اسپرین یا آئبوپروفین کے ساتھ خصوصی نگہداشت درکار ہوسکتی ہے۔ آپ کو دافع سوزش ادویات صرف اسی صورت میں لینی چاہئیں جب آپ کا ڈاکٹر آپ کے لئے ان کی تجویز کرے۔ اپنے ڈاکٹر، نرس یا فارماسسٹ سے گفتگو کیے بغیر 'بغیر نسخہ کے ملنے والی' دوائیں نہ لیں۔ آپ کو ٹرائمیٹھوپیرم پر مشتمل انٹی بایوٹک دواؤں سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔

### میں میتھائریکسیٹ کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟

اگر آپ میتھائریکسیٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے معالجہ کے بارے میں فکر مند ہیں تو، آپ کو اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ معلوماتی پرچہ میتھائریکسیٹ کے سبھی ضمنی اثرات پر مشتمل نہیں ہے۔ پوری تفصیل کے لئے میتھائریکسیٹ کے اپنے نسخے کے ساتھ لازمہ کے طور پر آنے والے ادویاتی معلوماتی پرچے پر نگاہ ڈالیں۔

تفصیلی کتابچوں کے ویب لنکس:

[www.dermnetnz.org/treatments/methotrexate.html](http://www.dermnetnz.org/treatments/methotrexate.html)

اس کتابچہ کا مقصد موضوع کے بارے میں قطعی معلومات فراہم کرنا ہے اور برٹش ایسوسی ایشن آف ڈرماٹولوجسٹس کے نمائندوں کے ذریعہ اس پر اتفاق رائے ہوا ہے؛ تاہم، اس کی مشمولات، کبھی کبھار آپ کے ڈاکٹر کے ذریعہ آپ کو دیئے جانے والے مشورے سے مختلف ہوسکتی ہیں۔

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ

Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: [admin@bad.org.uk](mailto:admin@bad.org.uk)

Registered Charity No. 258474

برٹش ایسوسی ایشن آف ڈرماٹولوجسٹس' کے مریضوں کی معلومات کے جائزہ بینل نے اس کتابچہ  
(انگریزی میں) کا قابل فہم ہونے کا جائزہ لیا ہے"

برٹش ایسوسی ایشن آف ڈرماٹولوجسٹس  
مریض کے لئے معلوماتی کتابچہ  
پیش کردہ اگست 2004  
تجدید شدہ اپریل 2010