



کھجلی

اس کتابچہ کے مقاصد کیا ہیں؟

یہ کتابچہ کھجلی کے بارے میں سمجھنے میں آپ کی مدد کے لئے تحریر کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس بارے میں کیا کیا جاسکتا ہے اور اس بارے میں مزید معلومات آپ کو کہاں سے حاصل ہوسکتی ہے۔

کھجلی کیا ہے؟

کھجلی ایک عام اور کافی خارش جلدی کیفیت ہے جو انسانی کھجلی والی چھڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا اثر کسی بھی عمر کے افراد پر پڑسکتا ہے لیکن یہ چھوٹے بچوں اور عمر رسیدہ افراد میں زیادہ عام ہے۔

کھجلی کس وجہ سے ہوتی ہے؟

جو چھڑیاں کھجلی کا باعث بنتی ہیں وہ چھوٹے طفیلی کیڑے، سونی کی نوک سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ بالعموم کسی ایسے فرد کے ساتھ جلد کے جلد سے براہ راست رابطے سے جس کو پہلے سے ہی کھجلی ہو، اور صرف کافی شاذ و نادر طور پر لباس اور بستر جیسی چیزوں سے ہوتے ہیں۔ پالتو جانوروں سے یہ نہیں پھیلتے ہیں۔ کھجلی والے افراد میں اوسطاً ایک درجن بڑی چھڑیاں ان کی جلد پر ہوتی ہیں؛ بعض لوگوں میں کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ گندہ رہنا کھجلی کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ شاذ و نادر طور پر، پھوٹی ہوئی کھجلی کے نام سے موسوم متغیر کھجلی ایسے مریضوں میں ہوسکتی ہے جو مامونیتی امتناعی ہیں یا جو عمر رسیدہ ہیں اور جن کی طبیعت ناساز ہے۔ اس متغیرہ میں جلد پر کھجلی کی ہزاروں چھڑیاں ہوتی ہیں اور یہ انتہائی متعدی ہے۔

کیا کھجلی موروثی ہے؟

نہیں، لیکن ایک ہی وقت میں خاندان کے متعدد افراد کا اس میں مبتلا ہونا عام سی بات ہے۔

کھجلی کی علامات کیا ہیں؟

خارش ہونا کھجلی کی اصل علامت ہے، جو بالعموم چھڑیاں لگنے کے قریب ایک مہینے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ خارش کا اثر جسم اور دھڑ پر پڑتا ہے لیکن بالعموم سر اور گردن میں زیادہ ہوتا ہے، سوائے شیر خوار بچوں کے۔ خارش اکثر و بیشتر رات میں بستر میں بدتر ہوجاتی ہے۔ ایک ہی خاندان میں متعدد افراد کا، اور ان کے دوستوں کا تقریباً ایک ہی وقت میں خارش زدہ ہوجانا عام بات ہے۔

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ

Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk

Registered Charity No. 258474

کھجلی کیسی نظر آتی ہے؟

کھجلی کا سرخ دانہ کھرونچ کے نشانات اور سرخ پیڑی دار حصوں کا ایک قدرے مشترک ہوتا ہے؛ بعد میں اس میں انفیکشن ہوجاتا ہے اور بیپ کے چھوٹے دھبے پیدا ہوجاتے ہیں۔ ایگزایما (جلد کی سوزش) سے مشابہ وسیع پیمانے پر پھیلنے والا سرخ دانہ کافی عام ہے۔ خارش سرخ دانہ جلد کے بیشتر حصے پر پھیل جاتا ہے لیکن چچڑیاں خاص کر انگلیوں کی تنگ جگہوں میں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں، کلائیوں، ٹخنوں اور پیر کے تلووں میں پائی جاتی ہیں۔ کھجلی والی چچڑیاں اپنے انڈے دینے کے لئے ان حصوں میں جلد کے اندر سوراخ بنا لیتی ہیں۔ سوراخ جلد پر چھوٹی خاکستری لائنوں کے بطور نمودار ہوتے ہیں۔ بالغ چچڑیاں کافی چھوٹی، صرف لگ بھگ 0.4 ملی میٹر لمبی ہوتی ہیں، جو عدسہ کی معرفت سوراخ کے سرے پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے سیاہ نقطہ کے بطور ظاہر ہوتے ہیں۔ پھوٹی ہوئی کھجلی میں سرخ دانہ چنبل کی طرح کا ہوسکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ شدید خارش کا باعث نہ بنے۔

کھجلی کی تشخیص کس طرح ہوتی ہے؟

آپ کا ڈاکٹر بالعموم واقعہ کی بنیاد پر اور سرخ دانے کے معائنے کی بنیاد پر کھجلی کی تشخیص کرسکے گا۔ سوراخ سے لیے جانے والے کٹرن پر چچڑیوں اور ان کے انڈوں کی موجودگی کے پیش نظر مائکروسکوپ سے نگاہ ڈالی جاسکتی ہے۔

کیا کھجلی کا مداوا ہوسکتا ہے؟

اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو، کھجلی مہینوں یا یہاں تک کہ سالوں تک رہتی ہے؛ لیکن صحیح علاج سے، یہ جلدی سے اور کلی طور پر ختم ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ علاج سے چچڑیوں کے ہلاک ہوجانے پر بھی خارش بالعموم چند ہفتوں تک باقی رہتی ہے۔

کھجلی کا علاج کس طرح ہوسکتا ہے؟

کھجلی کے علاج میں شامل ہے:

1. خود اپنی کھجلی سے نجات پانا۔
2. یقینی بنانا کہ آپ اور آپ کے رابطے میں آنے والے دوسرے افراد دوبارہ اس کی زد میں نہ آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے سبھی افراد اور جنسی رابطوں کا بھی علاج عین اسی وقت ہونا چاہیے جبکہ انہیں خارش ہو یا نہ ہو۔

کھجلی کے علاج میں متعدد مرکبات مؤثر ہیں۔ ان میں سے، پرمیٹھرن اور میلٹھین ایسے ہیں جو یوکے میں زیادہ عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جانچ کر لینا اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کو جو مرکب دیا گیا ہے وہ خاص طور پر کھجلی میں استعمال کے لئے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں عوامل متعدد ساختوں میں دستیاب ہیں، جن میں سے کچھ صرف سر کی جوؤں کے لئے مفید ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر ان خواتین کے لئے مختلف مرکبات کی تجویز کرسکتا ہے جو حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔

اپنی دوا کے ساتھ جاری تفصیلی ہدایات کی پیروی کریں؛ ان کی بنیاد درج ذیل اصولوں پر ہوگی:

- چچڑیاں جلد پر کسی بھی جگہ ہوسکتی ہیں، لہذا دوا صرف خارش سے اجتناب سے لیں، بلکہ بالوں میں گردن سے نیچے سبھی حصوں پر (اور بچوں میں کاسہ سر میں بھی) لگائی جانی چاہیے۔
- دوا کو کم از کم 12 گھنٹے تک یونہی چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد اس کو دھونا چاہیے۔
- جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تو، اس کے بعد بھی دوبارہ یہ دوا اپنے ہاتھوں پر لگائیں۔
- دو دوائیں، ایک ایک ہفتے پر، ضروری ہیں تاکہ پہلی بار دوا لگانے کے بعد انڈوں سے جو چچڑیاں باہر آئی ہیں وہ ہلاک ہو جائیں۔
- معمول کے مطابق بستر اور کپڑوں کی ایک بار دھلائی سے چچڑیوں کا صفایا ہو جائے گا۔
- دوا لگانے کے بعد غسل کرنا لازمی نہیں ہے۔

اگر کھجلی دوا کے تئیں مزاحم ہے یا اگر اس کا تعلق پھوٹنے والی قسم سے نہیں ہے تو، پھر آئیورمیکنٹ نامی کھائی جانے والی دوا تجویز کی جاسکتی ہے، جو بالعموم ایک ایک ہفتے پر ٹیبلیٹ کی دو خوراکیوں کے بطور لی جاتی ہیں۔

آخر میں، اگر آپ کو کسی جنسی ساتھی سے کھجلی لگ جاتی ہے تو، آپ کا ڈاکٹر دیگر ایسے امراض کی جانچ کر سکتا ہے جو ہوسکتا ہے اسی وقت آپ کو لگ گئے ہوں۔

میں کیا کر سکتا ہوں؟

اگر آپ خود کو دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو، آپ کامیابی کے ساتھ اپنی کھجلی کا صفایا کر دیں گے۔ آپ کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کے قریبی رابطہ میں آنے والے افراد عین اسی وقت یہ دوا لگائیں جب آپ لگائیں۔ بدقسمتی سے، دوبارہ کھجلی ہونا کافی عام ہے۔

میں کھجلی کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

انٹرنیٹ پر:

www.emedicine.com/emerg/topic517.htm

www.aad.org/pamphlets/Scabies.html

www.medinfo.co.uk/conditions/scabies.html

اس کتابچہ کا مقصد موضوع کے بارے میں قطعی معلومات فراہم کرنا ہے اور برٹش ایسوسی ایشن آف ڈرماٹولوجسٹس کے نمائندوں کے ذریعہ اس پر اتفاق رائے ہوا ہے؛ تاہم، اس کی مشمولات، کبھی کبھار آپ کے ڈاکٹر کے ذریعہ آپ کو دیئے جانے والے مشورے سے مختلف ہوسکتی ہیں۔

برٹش ایسوسی ایشن آف ڈرماٹولوجسٹس کے مریضوں کی معلومات کے جائزہ پینل نے اس کتابچہ (انگریزی میں) کا قابل فہم ہونے کا جائزہ لیا ہے

برٹش ایسوسی ایشن آف ڈرماٹولوجسٹس

مریض کے لئے معلوماتی کتابچہ

پیش کردہ اگست 2004

تجدید شدہ مئی 2010

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ

Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk

Registered Charity No. 258474