



## **Y CRAFU**

### **Beth yw nodau'r daflen hon?**

Ysgrifennwyd y daflen hon i'ch helpu chi i ddeall mwy am y crafu. Bydd yn dweud wrthy ch beth yw'r crafu, beth sy'n ei achosi, beth allwch chi wneud yn ei gylch a ble gallwch gael mwy o wybodaeth amdano.

### **Beth yw'r crafu?**

Mae'r crafu yn gyflwr cyffredin y croen ac yn gyflwr coslyd iawn a achosir gan widdon dynol y crafu. Gall effeithio ar bobl unrhyw oed ond ymhlith yr ifanc a'r henoed y mae'r fwyaf cyffredin.

### **Beth sy'n achosi'r crafu?**

Mae'r gwiddon sy'n achosi'r crafu yn barasitiaid mân, yn llai na blaen pin. Fel arfer cânt eu codi trwy gysylltiad croen i groen gyda rhywun sydd eisoes â'r crafu, ac ond yn anaml iawn y cânt eu codi o bethau fel dillad neu ddillad gwely. Nid yw anifeiliaid anwes yn eu lledaenu. Mae gan bobl sydd â'r crafu gyfartaledd o ryw ddwsin o widdon oedolion ar eu croen; bydd ychydig o bobl yn cario llawer mwy. Nid yw bod yn fudr yn achosi'r crafu. Yn anaml iawn, gall amrywiad ar y crafu ddigwydd, o'r enw'r crafu cramennog, mewn cleifion sydd ag imiwnedd wedi'i atal neu gleifion sy'n oedrannus ac yn anhwylyd. Mae miloedd o widdon y crafu ar y croen yn yr amrywiad hwn, ac mae'r heintus dros ben.

### **A yw'r crafu yn etifeddol?**

Nac ydy, ond mae'r beth cyffredin i sawl aelod o'r teulu ei gael ar yr un pryd.

## **Beth yw symptomau'r crafu?**

Cosi yw prif symptom y crafu, ac fel arfer bydd yn dechrau tua mis ar ôl codiŵ gwiddon. Bydd y costiŵ effeithio ar y corff aŵ aelodau, ond ni fydd yn lledaenu iŵ pen aŵ gwddf fel arfer, ac eithrio mewn babanod. Bydd y costiŵ gwaethygu yn y gwely yn ystod y nos. Maeŵ beth cyffredin i nifer o bobl yn yr un teulu, aŵ ffrindiau, deimloŵ goslyd tuaŵ un pryd.

## **Sut olwg sydd ar y crafu?**

Mae brech y crafu yn gymysgedd o farciau crafu a manau cennog coch; nes ymlaen gall fynd yn heintiedig a datblygu smotiau crawn bach. Mae brech debyg i ecsema (dermatitis) yn gyffredin iawn. Bydd y frech goslyd hon yn gorchuddio llawer oŵ croen, ond ym manau gweog y bysedd ac ar gledrauŵ dwylo, yr arddyrnau, y pigyrnau a gwadnauŵ traed y ceir y gwiddon yn bennaf. Bydd gwiddon y crafu yn tyrchu i mewn iŵ croen yn y manau hyn er mwyn dodwy eu hwyau. Bydd tyrchfeydd yn ymddangos fel llinellau llwydaidd bach ar y croen. Mae gwiddon oedolion yn fân iawn, dim ond rhyw 0.4 mm o hyd, a thrwy lens maent yn edrych fel dot tywyll bach ar flaen tyrchfa. Yn y crafu cramennog, gall y frech fod yn debyg i soriasis ac efallai na fydd yn achosi costi mawr.

## **Sut mae'r diagnosis o'r crafu yn cael ei wneud?**

Fel arfer bydd eich meddyg yn gallu gwneud diagnosis oŵ crafu ar sail y stori ac wrth archwilioŵ frech. Gellir edrych ar grafion o dyrchfa o dan ficrosgop am widdon aŵ hwyau.

## **A ellir gwella'r crafu?**

Os na chaiff ei drin, bydd y crafuŵ para am fisoedd neu flynyddoedd hyd yn oed; ond gydaŵ driniaeth iawn, bydd yn clirioŵ gyflym ac yn llwyr. Hyd yn oed ar ôl iŵ gwiddon gael eu lladd gan driniaeth, bydd y costiŵ parhau am rai wythnosau fel arfer.

## **Sut ddylid trin y crafu?**

Maeŵ driniaeth ar gyfer y crafuŵ cynnwys:

1. Cael gwared ar eich crafu eich hun.

2. Gwneud yn siwr nad ydych chi a chysylltiadau eraill yn ei ddal eto. Mae hyn yn golygu bod rhaid i holl aelodauꝑ teulu a chysylltiadau rhywiol gael eu trin hefyd ar yr un pryd, ꝑꝑn a ydynt yn goslyd neu beidio.

Mae nifer o baratoadau yn trin y crafuꝑ effeithiol. Oꝑ rhain, permethrin a malathion ywꝑ rhai a ddefnyddir amlaf yn y DU. Maeꝑ werth gwirio fod y paratoad a roddwyd i chi yn un sydd wediꝑ baratoiꝑ arbennig iꝑw ddefnyddio gydaꝑ crafu, gan fod y ddau gyfrwng ar gael mewn nifer o fformwleiddiadau, rhai ohonynt ond yn ddefnyddiol ar gyfer llau pen. Gall eich meddyg awgrymu paratoadau gwahanol i fenywod syꝑ feichiog neu syꝑ bwydo ar y fron, neu ar gyfer babanod.

Dilynwch y cyfarwyddiadau a roddwyd gydaꝑh triniaeth yn fanwl; byddant yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

- Gall y gwiddon fod unrhyw le ar y croen, felly rhaid taenuꝑ driniaeth bob man o dan y gwddf mewn oedolion (a hefyd i groen y pen mewn plant), ac nid ar y manau coslyd yn unig.
- Dylid gadael y driniaeth ar y croen am 12 awr o leiaf cyn ei golchi i ffwrdd.
- Pan fyddwch yn golchiꝑh dwylo, rhowch y driniaeth ar eich dwylo eto ar ôl hynny.
- Mae angen dwy driniaeth, gydag wythnos rhyngddynt, er mwyn lladd gwiddon sydd wedi deor o wyau ar ôl y taeniad cyntaf.
- Bydd un golchiad arferol ar gyfer dillad gwely a dillad yn difaꝑ gwiddon.
- Nid oes angen cymryd bach cyn triniaeth.

Os ywꝑ crafu yn gwrthod ymateb i driniaeth neu os mai crafu math cramennog ydyw, yna efallai y rhoddir presgripsiwn ar gyfer triniaeth eneuol oꝑ enw ivermectin, fel dau ddos o dabledi iꝑw cymryd gydag wythnos rhyngddynt fel arfer.

Yn olaf, os dalioch eich crafu oddi wrth bartner rhywiol, efallai y bydd eich meddyg eisiau gwirio am bresenoldeb clefydau eraill y gellid fod wediꝑ codi ar yr un pryd.

### **Beth allaf i wneud?**

Os dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir i chi, byddwch yn clirioꝑh crafu yn llwyddiannus. Dylech hefyd wneud yn siwr bod pob un oꝑh cysylltiadau agos yn taenuꝑ driniaeth ar yr un pryd â chi. Mae dal y crafu eto yn eithaf cyffredin, yn anffodus.

**Ble allai gael mwy o wybodaeth am y crafu?**

*Ar y Rhyngrwyd:*

[www.emedicine.com/emerg/topic517.htm](http://www.emedicine.com/emerg/topic517.htm)

[www.aad.org/pamphlets/Scabies.html](http://www.aad.org/pamphlets/Scabies.html)

[www.medinfo.co.uk/conditions/scabies.html](http://www.medinfo.co.uk/conditions/scabies.html)

**Nod y daflen hon yw rhoi gwybodaeth gywir i chi am y pwnc ac mae'n gonsensws o farnau cynrychiolwyr Cymdeithas Dermatolegwyr Prydain: gall ei chynnwys, fodd bynnag, fod yn wahanol ambell waith i'r cyngor a roddir i chi gan eich meddyg.**

*Aseswyd y daflen hon (yn Saesneg) am ei rhwyddineb darllen gan Banel Adolygu Lleyg Gwybodaeth i Gleifion Cymdeithas Dermatolegwyr Prydain*

**CYMDEITHAS DERMATOLEGWYR PRYDAIN  
TAFLEN GWYBODAETH I GLEIFION  
CYNHYRCHWYD AWST 2004  
DIWEDDARWYD MAI 2010**